

Proteasome 26S S10 (YD16287) Rabbit mAb

货号: **AYD14870**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF FC |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 24kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | Cytoplasm, Nucleus |
| 纯化 | |

抗原信息



| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | Acts as a chaperone during the assembly of the 26S proteasome, specifically of the PA700/19S regulatory complex (RC). In the initial step of the base subcomplex assembly is part of an intermediate PSMD10:PSM C4:PSMC5:PAAF1 module which probably assembles with a PSMD5:PSMC2:PSMC1:PSMD2 module. Independently of the proteasome, regulates EGF-induced AKT activation through inhibition of the RHOA/ROCK/PT EN pathway, leading to prolonged AKT activation. Plays an important role in RAS-induced tumorigenesis |
| 基因ID | 5716 |
| 基因名 | PSMD10 |
| Swiss | O75832 |

| | |
|----|------------------------------|
| 别名 | Proteasome 26S S10 (YD16287) |
|----|------------------------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn