

— ABLYBIO, Help Your Research



TRAM2 Rabbit mAb

货号: **AYM28912**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | 43kDa |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | HepG2 cells, Sp2/0 cells |
| 细胞定位 | Membrane ; Multi-pass membrane |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human TRAM2. |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|------|
| 研究背景 | |
| 基因ID | 3134 |

| | |
|-------|--|
| 基因名 | TRAM2 |
| Swiss | Q15035 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15035/entry) |
| 别名 | TRAM2,TRAM2 Rabbit mAb,KIAA0057 |

产品验证



Western blot analysis of TRAM2 expressed in HepG2 cells, Sp2/0 cells using TRAM2 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)