— ABLYBIO, Help Your Research

# Phospho-Histone H2B (T129) Rabbit mAb

**货号: AYM30029**

## 产品信息

| | |
|---|---|
| 反应 | yeast |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB |
| 推荐浓度 | **WB:** 1:500 - 1:2000 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | 14kDa |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | Recombinant protein |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | Affinity purification |

## 抗原信息


| | |
|---|---|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to yeast Phospho-Histone H2B (T129). |

## 靶点信息

| | |
|---|---|
| 研究背景 | |
| 基因ID | |

| | |
|---|---|
| 基因名 | |
| **Swiss** | P02293 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02293/entry) |
| 别名 | Phospho-Histone H2B (T129),Phospho-Histone H2B (T129) Rabbit mAb |

## 产品验证




Western blot analysis of Phospho-Histone H2B (T129) expressed in Recombinant protein using Phospho-Histone H2B (T129) Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (https://www.ablybio.cn//www.ablybio.cn)