

— ABLYBIO, Help Your Research



TAGAP Rabbit mAb

货号: **AYM30941**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IP |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:20 - 1:50 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | 65,90kDa |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human TAGAP. |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--------|
| 研究背景 | |
| 基因ID | 117289 |

| | |
|-------|---|
| 基因名 | TAGAP |
| Swiss | Q8N103 |
| 别名 | TAGAP,TAGAP Rabbit mAb,T-cell activation GTPase-activating protein,TAGAP1 |

产品验证



Western blot analysis of TAGAP expressed in human esophagus cancer, mouse heart, rat heart using TAGAP Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)