

CRISPR-Cas9 SP Rabbit mAb

货号: **AYM30989**

产品信息

反应	Streptococcus,pyogenes
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	158kDa
实测分子量	158kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,293T-Cas9
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Streptococcus CRISPR-Cas9 SP .
序列	YVGPLARGNSRFAWMTRKSEETITPWNFEEVVDKGASAQSFIERMTNFDKNLPNEKVLPHKSHLLYEYFTVYNELTKVKYVT EGMRKPAFLSGEQKKAIVDLLFKTNRKVTVKQLKEDYFKKIECFDSVEISGVEDRFNASLGTYHDLLKIIKDKDFLDNEENE DILEDIVLTLTLFEDREMIEERLKTYAHLFDDKVMKQLKRRRYTGWGRLSRKLINGIRDKQSGKTILDFLKSDGFANRNFMQ LIHDDSLTFKEDIQKAQVSGQGDSLHEHIANLAGSP

靶点信息

研究背景	
基因ID	901176

基因名	
Swiss	Q99ZW2
别名	CAS9

产品验证



Western blot analysis of CRISPR-Cas9 SP expressed in 293T,293T-Cas9 using CRISPR-Cas9 SP Rabbit m Ab at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 12 0s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn