

FAIM3 Rabbit pAb

货号: **AYP13451**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Rattus norvegicus
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	31kDa/33kDa/43kDa
实测分子量	40kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,U-251MG,SW480
细胞定位	Membrane,Secreted,Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 18-251 of human FAIM3 (NP_005440.1).
序列	RILPEVKVEGELGGSVTIKCLPEMHVRIYLCREMAGSGTCGTVVSTTNFIKAIEYKGRVTLKQYPRKNLFLVEVTQLTESDSG VYACGAGMNTDRGKTQKVTLNVHSEYEPSWEEQMPETPKWFHLPYLFQMPAYASSKFVTRVTTPAQRGKVPVHHS SPTTQITHRPRVSRASSVAGDKPRTFLPSTTASKISALEGLLKPQTPSYNHHTLRLHRQRALDYGSQSGREGQG

靶点信息

研究背景	Fc receptors specifically bind to the Fc region of immunoglobulins (Igs) to mediate the unique functions of each Ig class. FAIM3 encodes an Fc receptor for IgM (see MIM 147020) (Kubagawa et al., 2009 [PubMed 19858324]; Shima et al., 2010 [PubMed 20042454]).[supplied by OMIM, Jul 2010]
基因ID	9214

基因名	FCMR
Swiss	O60667
别名	FCMR;FAIM3;TOSO

产品验证



Western blot analysis of FAIM3 expressed in Jurkat,U-251MG,SW480 using FAIM3 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn