

— ABLYBIO, Help Your Research



APOBEC3C Rabbit pAb

货号: **AYP15482**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:50 - 1:100
理论分子量	22kDa
实测分子量	22kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human APOBEC3C (NP_055323.2).
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the cytidine deaminase gene family. It is one of seven related genes or pseudo genes found in a cluster thought to result from gene duplication, on chromosome 22. Members of the cluster encode proteins that are structurally and functionally related to the C to U RNA-editing cytidine deaminase APOBEC1. It is thought that the proteins may be RNA editing enzymes and have roles in growth or cell cycle control.
基因ID	27350
基因名	APOBEC3C
Swiss	Q9NRW3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NRW3/entry)
别名	APOBEC3C,A3C,APOBEC1L,ARDC2,ARDC4,ARP5,PBI,bK150C2.3,APOBEC3C Rabbit pAb,APOBEC1-like,Phorbolin I

产品验证



Western blot analysis of APOBEC3C expressed in K-562 using APOBEC3C Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)