

— ABLYBIO, Help Your Research



# HTATIP2 Rabbit pAb

货号: **AYP16910**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	14kDa/27kDa/30kDa
实测分子量	27kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus envelope
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100 to the C-terminus of human HTA TIP2 (NP_006401.3).
------	---

## 靶点信息

研究背景	Oxidoreductase required for tumor suppression. NADPH-bound form inhibits nuclear import by competing with nuclear import substrates for binding to a subset of nuclear transport receptors. May act as a redox sensor linked to transcription through regulation of nuclear import. Isoform 1 is a metastasis suppressor with proapoptotic as well as antiangiogenic properties. Isoform 2 has an antiapoptotic effect.
基因ID	10553
基因名	HTATIP2
Swiss	Q9BUP3 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BUP3/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BUP3/entry</a> )
别名	HTATIP2,CC3,SDR44U1,TIP30,HTATIP2 Rabbit pAb,30 kDa HIV-1 TAT-interacting protein,HIV-1 TAT-interacti ve protein 2

## 产品验证



Western blot analysis of HTATIP2 expressed in LO2 using HTATIP2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)