

Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 Rabbit pAb

货号: AYP20813

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	65KDa/73KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,C6
细胞定位	cytoplasm,cytosol,mitochondrion,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around T24 of human FOXO1/FOXO3A/FOXO4FOXO1 (NP_002006.2).
序列	SCTWP

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct fork head domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in myogenic growth and differentiation. Translocation of this gene with PAX3 has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
基因ID	2308,2309,4303

基因名	FOXO1,FOXO3,FOXO4
Swiss	Q12778,O43524
别名	FoxO1/FoxO3a/FoxO4

产品验证



Western blot analysis of Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 expressed in Jurkat, C6 using Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5 % non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn