

# MED15 Rabbit pAb

货号: **AYP21188**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	87kDa
实测分子量	87kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Mouse brain,Rat heart,Rat brain
细胞定位	cytoplasm,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MED15 (NP_001003891.1).
序列	MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSLTGGPAAGAAGIG

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a subunit of the multiprotein complexes PC2 and ARC/DRIP and may function as a transcriptional coactivator in RNA polymerase II transcription. This gene contains stretches of trinucleotide repeats and is located in the chromosome 22 region which is deleted in DiGeorge syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	51586

基因名	MED15
Swiss	Q96RN5
别名	MED15;ARC105;CAG7A;CTG7A;PCQAP;TIG-1;TIG1;TNRC7

## 产品验证



Western blot analysis of MED15 expressed in Mouse heart,Rat heart,Mouse brain using MED15 Rabbit p Ab at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120 S.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)