

# MOC3 Rabbit pAb

货号: **AYP23038**

## 产品信息

|       |  |
|-------|--|
| 反应    | Oryza sativa   |
| 宿主    | Rabbit   |
| 克隆性   | Polyclonal   |
| 预测反应  |  |
| 应用    | WB   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000  |
| 理论分子量 | 31kDa  |
| 实测分子量 | 31kDa  |
| 形式    | Liquid   |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated   |
| 阳性对照  | Stems,tiller buds  |
| 细胞定位  |  |
| 纯化    | Affinity purification  |

## 抗原信息


|      |   |
|------|---|
| 抗原信息 | Recombinant protein of Oryza sativa MOC3. |
| 序列   |   |

## 靶点信息

|       |  |
|-------|--|
| 研究背景  | Transcription repressor required for the formation and development of tiller buds and panicles |
| 基因ID  | 107275471  |
| 基因名   |  |
| Swiss | A0A0N7KJV6   |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 别名 | MOC3; OsWUS; TAB1; SRT1; DC1 |
|----|------------------------------|

## 产品验证



Western blot analysis of MOC3 expressed in Stems,tiller buds using MOC3 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5 % non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)