


trans-1,2-Cyclohexanediaminetetraacetic acid

货号: **B26792**



产品信息

生物活性	trans-1,2-Cyclohexanediaminetetraacetic acid is a commonly used aminopolycarboxylic acid and a strong chelator of heavy metal ions.
CAS	13291-61-7
中文名称	
分子量	346.33
体外研究	
体内研究	
形式	Solid
运输条件	Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
保存条件	

溶解性	In Vitro: H₂O : 5 mg/mL (14.44 mM); ultrasonic and warming and heat to 80°C) 配制储备液 <table><tr><th>浓度</th><th>溶剂</th><th>体积</th><th>质量</th><th>1 mg</th><th>5 mg</th><th>10 mg</th></tr><tr><td>1 mM</td><td>2.8874 mL</td><td>14.4371 mL</td><td>28.8742 mL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 mM</td><td>0.5775 mL</td><td>2.8874 mL</td><td>5.7748 mL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 mM</td><td>0.2887 mL</td><td>1.4437 mL</td><td>2.8874 mL</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液；一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限：-80°C, 6 months; -20°C, 1 month。-80°C 储存时，请在 6 个月内使用，-20°C 储存时，请在 1 个月内使用。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液，再依次添加助溶剂： ——为保证实验结果的可靠性，澄清的储备液可以根据储存条件，适当保存；体内实验的工作液，建议您现用现配，当天使用； 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比；如在配制过程中出现沉淀、析出现象，可以通过加热和/或超声的方式助溶 1. 请依序添加每种溶剂： 10% DMSO 90% corn oil Solubility: ≥ 1.67 mg/mL (4.82 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 1.67 mg/mL (4.82 mM，饱和度未知) 的澄清溶液，此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。 以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 16.7 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL玉米油中，混合均匀。 *以上所有助溶剂都可在 MCE 网站选购。	浓度	溶剂	体积	质量	1 mg	5 mg	10 mg	1 mM	2.8874 mL	14.4371 mL	28.8742 mL				5 mM	0.5775 mL	2.8874 mL	5.7748 mL				10 mM	0.2887 mL	1.4437 mL	2.8874 mL			
浓度	溶剂	体积	质量	1 mg	5 mg	10 mg																							
1 mM	2.8874 mL	14.4371 mL	28.8742 mL																										
5 mM	0.5775 mL	2.8874 mL	5.7748 mL																										
10 mM	0.2887 mL	1.4437 mL	2.8874 mL																										
纯度																													